

Stades  
de la culture



|                                           |  |                               |                                  |                                 |                             |
|-------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Mineuses                                  |  | <b>Imidashot</b><br>14 g/hl   |                                  |                                 |                             |
| Cochenilles                               |  |                               |                                  | <b>Proximo</b><br>50 cc/hl      |                             |
| Acaricid                                  |  |                               |                                  | <b>Diablo</b><br>50 g/hl        |                             |
| Pourriture brune                          |  |                               |                                  | <b>BORDO 25WG</b><br>400 g/hl   | <b>Alfil</b><br>250 g/hl    |
| Gommose à phytophthora                    |  | <b>HIDRO-CUP</b><br>500g/hl   |                                  |                                 |                             |
| Adventices                                |  | <b>Focus® Ultra</b><br>4 L/ha | <b>Atila</b><br>4 L/ha           | <b>Laser</b><br>3 L/ha          | <b>Laser plus</b><br>3 L/ha |
| Enracineur                                |  | <b>Rootex</b><br>1 kg/ha      |                                  |                                 |                             |
| Acide humique et fulvique                 |  | <b>H-85 WG</b><br>1 kg/ha     | <b>Humi Top</b><br>5 à 10 l/ha   | <b>Ferti Top</b><br>5 à 10 l/ha |                             |
| Oligo-éléments                            |  | <b>Traxex</b> 1 à 2 kg/ha     |                                  |                                 |                             |
|                                           |  | <b>Maxi-Grow</b> 0,5 L/ha     |                                  |                                 |                             |
| Fer                                       |  |                               | <b>Libfer® SP</b><br>1,5 kg/ha   | <b>Ferplus</b><br>2 à 5 kg/ha   |                             |
| Zinc                                      |  |                               | <b>Librel Zn</b> 0,5 à 1 kg/ha   |                                 |                             |
| Manganèse                                 |  |                               | <b>Librel Mn</b> 0,5 à 1 kg/ha   |                                 |                             |
| Mouillant et stimulant à base de triazone |  | <b>TRISERT</b><br>5 L/ha      |                                  |                                 |                             |
| Calibre, coloration et taux de sucre      |  |                               |                                  | <b>KTS</b> 5L/ha                | <b>Agro-K</b> 2Kg/ha        |
| Calcium                                   |  | <b>CaTs</b><br>5 L/ha         | <b>Mainstay Calcio</b><br>3 L/ha |                                 |                             |
| Qualité post-récolte                      |  |                               |                                  | <b>Barrier</b> 2 L/ha           |                             |

