

# Élevage de Grande Tortue

(*Nymphalis polychloros* – *nymphalidae*)

## Les chenilles

Le 6 mai 2007, je capture 3 chenilles sur mon cerisier, qui présentent deux stades de leur développement :



Après engraissement, voici les plus âgées prêtes pour la nymphose, deux semaines plus tard, dans ma cage d'élevage de chenilles. Elles se promenaient déjà depuis quelques jours au « plafond » de leur cage, pour s'y suspendre à l'aide de fils de soie...



## La métamorphose

Dès le lendemain, 20 mai, la chrysalide est formée, seul reste un « masque » de chenille qui se dessèche et tombe.



Je décroche délicatement chaque chrysalide au cutter, pour les suspendre à l'aide d'un fil dans la cage spéciale pour papillons.

Le 22 mai, c'est au tour de la troisième chenille de se préparer : j'ai pris la précaution de la placer dans la cage d'élevage « papillons » la veille, alors qu'elle se promenait au « plafond » de la cage des chenilles pour s'y suspendre.

Dès le soir du 22 mai, la chrysalide est formée.



## L'imago

Enfin, le 31 mai, le premier papillon émerge d'une chrysalide, après seulement 11 jours de nymphose.



Le lendemain, c'est au tour de la deuxième chrysalide de noircir, puis de s'ouvrir pour laisser apparaître un deuxième papillon, pendant que le premier finit de sécher ses ailes et s'entraîne à voler.



Le 3 juin, la troisième chrysalide commence à foncer à son tour... Je relâche les deux premiers papillons.

La dernière naissance a lieu le 4 juin, soit 13 jours après le début de la nymphose.

